

## CASO CLINICO 05

**Escenario del evento:** Domicilio

### **Anamnesis:**

Paciente femenina de 1 año de edad

Madre de la paciente indica que la paciente se tropieza con unas varillas y cae de su propia altura quedando inconsciente por 1 minuto aproximadamente, indica que posterior a la caída sufre convulsión por 1 minuto aproximadamente, indica que siempre que sufre caídas pierde el conocimiento.

### **Examen Físico:**

Paciente irritable no evidencia de signos de trauma en cabeza, ruidos pulmonares conservados, abdomen suave no doloroso a la palpación, pulsos distales conservados en las cuatro extremidades, Saturación O<sub>2</sub>: 95%

### **Signos Vitales:**

Pupilas Isocóricas normo reactivas

**ECG:** 14/15 - **O:** 4; **V:** 4; **M:** 6

	<b>Pulso:</b>	<b>Presión arterial</b>	<b>Frecuencia Respiratoria</b>
<b>Escena:</b>	112	-	26
<b>Transporte:</b>	151	-	25
<b>Entrega:</b>	120	-	25

### **Procedimientos:**

Oxígeno a 2 litros x minuto.

**IDG:** TCE moderado

### **PRE REQUISITOS**

1. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta con las poblaciones especiales (niños, adultos mayores, y pacientes embarazadas) en el trauma pre hospitalario?
2. ¿Con que criterios clínicos llegamos a la sospecha de TCE?
3. ¿Cuál es la sintomatología que no da indicaciones de un TCE?
4. Con la sospecha de un TCE, ¿cómo debería ser nuestra actuación en la evaluación, tratamiento y transporte de este paciente?